# レジメン登録内容

診療科：血液内科　　対象疾患：非ホジキンリンパ腫

申請医師:
コード：B-6020
承 認 日：2024/03/08

レジメン名：Epcoritamab[1コース目]

1コース：28 日間　　標準コース数：1　　回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮下注射 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エプキンリ皮下注 | 0.16 mg/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 20mL | 1 V/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※支持薬服用後30-120分後に投与 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※シリンジで交付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 皮下注射 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エプキンリ皮下注 | 0.8 mg/body | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 20mL | 1 V/body | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※支持薬服用後30-120分後に投与 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※シリンジで交付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 皮下注射 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エプキンリ皮下注 | 48 mg/body | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| | 生理食塩液注 20mL | 1 V/body | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| | ※シリンジで交付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EBM：
Thieblemont C,et al:Epcoritamab,a Novel,Subcutaneous CD3xCD20 Bispecific T-Cell-Engaging Antibody,in Replapsed or Refractory Large B-Cell Lymphoma:Dose Expansion in a Phase Ⅰ/Ⅱ Trial.J Clin Oncol.2023.41(12):2238-2247
Hutchings M,et al.:Dose escalation of subcutaneous epcoritamab in patients with relapsed or refractory B-Cell non-Hodgkin lymphoma:an open-label,phase 1/2 study.
Lancet.2021,398(10306):1157-1169
エプキンリ皮下注添付文書、適正使用ガイド

# レジメン登録内容

診療科：血液内科　　対象疾患：非ホジキンリンパ腫

申請医師:
コード：B-6020
承 認 日：2024/03/08

レジメン名：Epcoritamab[1コース目]

1コース：28 日間　　標準コース数：1　　回

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
day1-4,8-11,15-18,22-25
プレドニゾロン　100mg/day
(day1,8,15,22 エプキンリ投与30～120分前)

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
day1,8,15,22 エプキンリ投与30～120分前
アセトアミノフェン　1000mg　p.o.
レスタミン　50mg　p.o.